

WELL CHILD EXAM - INFANCY: 6 MONTHS

(Meets EPSDT Guidelines)

DATE	

嬰兒期:6個月						
	兒童姓名			出生日期		
	過敏症		目前用藥			
童的情況	自上次體檢後出現的病症/事故/問題/擔憂			今天我有一個不明白的問題・關於:		
由家長填寫兒童的情況	是 否 我的寶寶吃一些固體食物。 我的寶寶會發出"da da"或"ba ba" 之類的寶寶會發出"da da"或"ba ba" 之類的聲 我的寶寶能在別人幫助/扶撐下坐立。 我不經常感到悲傷。	聲音。	是 否 我的寶寶會拾取東西。 我的寶寶好像很高興。 我的寶寶認識我。			
WEIGHT K		PERCENTILE	Diet			
Review of systems Review of family history			Elimination Sleep			
Screening: N A Hearing			Review Immunization Record Lead exposure Fluoride Supplements Fluoride Varnish Hct/Hgb Health Education: (Check all discussed/handouts given) Family Planning Safety Infant Temperament Development Crib Safety Shaken Baby Syndrome No Bottle in Bed Feeding Fever Teething/Dental Bedtime ritual Language Stimulation Stranger Anxiety Appropriate Car Seat Child care Passive Smoke Other: Assessment/Plan:			
Describe abnormal findings and comments:						
		IMMUNIZATIONS GIVEN				
		REFERRALS HEALTH PROVIDER NAME				
NEXT VISIT: 9 MONTHS OF AGE		HEALTH PROVIDER NAME HEALTH PROVIDER ADDRESS				
	9SHS 13-683C CH (REV. 08/2004)					

DISTRIBUTION: White - Physician Yellow - Parent/Guardian

SEE DICTATION

Guidance to Physicians and Nurse Practitioners for Infancy (6 months)

The following highlight EPSDT screens where practitioners often have questions. They are not comprehensive guidelines.

Fluoride Screen

Look for white spots or decay on teeth. Check for history of decay in family. Fluoride supplements should be considered for all children drinking fluoride deficient (<0.6 ppm F) water. Before supplements are prescribed, it is essential to know the fluoride concentration of the patient's drinking water. Once the fluoride level of the water supply has been evaluated, either through contacting the public health officials or water analysis, as well as evaluating other sources of fluoride, the daily dosage schedule can be recommended. Pediatric Dentistry: Reference Manual 1999--00.(21)5.

Hearing Screen

Use clinical judgment.

Lead Screen

Screen infants for these risk factors:

- Live in or frequently visit day care center, preschool, baby sitter's home or other structure built before 1950 that is dilapidated or being renovated.
- Come in contact with other children with known lead toxicity (i.e., blood lead 15ug/dl).
- Live near a lead processing plant or with parents or household members who work in a lead-related occupation (e.g., battery recycling plant).

Developmental Milestones

Always ask about and follow-up on parent concerns about development or behavior. You may use the following screening list, or use the Ages and Stages Questionnaire, the Denver II, the ELMS2 (a language screen), or the MacArthur Communication Development Inventory.

Yes	No		Yes	No		
		No head lag when pulled to sit.			Turns toward voice.	
		Bears some weight on legs when held.			Transfer object from h	nand to hand.
		Rolls over.			Cuddles.	
		Imitates speech sounds.	A	voids	eye contact.	

Instructions for developmental milestones: At least 90% of infants should achieve the underlined milestones by this age. If you have checked "no" on any two items, or even one of the underlined items, or the boxed item, refer the infant for a formal developmental assessment.

Notes: Immunization schedules are from the Advisory Committee on Immunization Practice of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Parents and providers may call Healthy Mothers, Healthy Babies (1-800-322-2588) with questions or concerns on childhood development.



健康兒童體檢 - 嬰兒期: 6個月 WELL CHILD EXAM - INFANCY: 6 MONTHS

/\II/	(符合EPSDT早期分	官期檢查、	診斷和治療指南標	準)	日期	
嬰兒期:6個月						
	兒童姓名 兒童由誰				出生日期	
	過敏症		目前用藥			
3童的情况	自上次體檢後出現的病症/事故/問題/擔憂			今天我有一個不明白的	問題,關於:	
由家長填寫兒童的情況	是 否 我的寶寶吃一些固體食物。	。 [我的寶寶	會拾取東西。 好像很高與。 認識我。		
體重 千克/	身高 厘米/英寸 百分比 頭圍 百分比	1	飲食			
一檢聽視發適大細行心身整皮頭眼耳鼻口頸淋查力力育應的致為理體體膚部睛朵子咽部巴:檢檢:常肌的一健:外一位作	查	- 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	# 接	「新有已討論過/已發始」 安全 「要兒床安全」 嬰兒床安全 「限食」 入睡過程 「私見」 托兒	嬰兒性情	
		轉	介			
	下次檢查:9個月	保	建服務機構名稱			
保健服務機	機構簽名	保	建服務機構地址			

嬰兒期:6個月

6個月小寶寶的保健

重要標誌

小寶寶在6至9個月期間的生長發育。

發出"ba-ba-ba""dada"之類的聲音。

能用手掌握住小東西,然後用手指夾住。

把東西放進嘴裡,能自己吃一些小塊的軟質 食物。

能坐穩。

在攙扶下能站立。

趴在地板上移動,並開始爬行。

可能開始認生。

您可以在與您的小寶寶玩耍時幫助她學會新 技能。

若需要幫助或詳細資訊,請電

玩具與嬰幼兒產品安全:

消費者產品安全委員會 1-800-638-2772 (留言)或 1-800-638-8270 (TTY中繼轉發)

學習嬰兒和兒童人工呼吸和急救措施:

向當地的消防站或美國紅十字會或心臟學會 分會或衛生部詢問是否提供此培訓課。

兒童健康與發育、免疫:

健康母親、健康寶寶資訊和轉介專線 1-800-322-2588 (留言)或 1-800-833-6388 (TTY中繼轉發)

子女教養技巧或支持:

家庭幫助專線 1-800-932-HOPE (4673) 西北地區家庭服務資源 1-888-746-9568當地社區學院課程

保健須知

您的小寶寶需要接種幾種常見疫苗來完成全面免疫。若您的小寶寶漏掉任何一種,應該預約門診補上。

向您的小寶寶展示彩色圖畫書並談論書中的圖畫。 不斷哼唱簡單的歌曲和説童謠。

以下跡象説明小寶寶可以開始吃固體食物:

- 祇需很少幫助或者不需幫助就能坐起來。
- 顯出想要吃您的食物的樣子。
- 能用舌頭將食物推入喉嚨。

您的小寶寶會向您表示他已吃飽了。在他吐出食物、閉上嘴或轉過頭時,應停止喂他。讓他來控制 自己要吃多少。

應該讓小寶寶開始學習用用杯子喝水。在杯子 裡倒入水、母乳或嬰兒喂養奶。不要讓小寶寶 拿奶瓶上床。

子女教養須知

讓您的小寶寶有大量的時間趴在地板上玩。把玩具放在遠處,這樣他會試圖爬行。

開始一起玩一些簡單的游戲,如"藏貓貓"和"拍手"游戲。

安全須知

在您的小寶寶開始爬行前,應保證您家環境安全。 在幾年之內,您一直需要這樣做。

- 把小東西和易碎物品收好。
- 把電線用膠帶粘貼在牆上,把插座蓋好。
- 在樓梯的頂部和底部裝上安全門。
- 把毒性物品和藥品放在櫥櫃裡鎖好。

小寶寶助步器所導致的傷害要比其他任何嬰幼兒產品都要多。不用助步器,而用不帶輪子的椅子,或 讓小寶寶趴在地板上。

DSHS 13-683C CH (REV. 08/2004)